

2007-08 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a public or private school in Texas.

VACCINE	REQUIRED DOSES
Diphtheria, Tetanus, and Pertussis (DTaP/DTP/DT/Tdap/Td) Booster Dose	Five doses of a diphtheria-tetanus-pertussis containing vaccine, one of which must have been received on or after the fourth birthday; however, 4 doses meet the requirement if the 4 th dose was given on or after the 4 th birthday One dose is required ten years after last dose of DTP/DTaP/DT
Polio	Four doses of polio vaccine one of which must have been received on or after the fourth birthday; however, 3 doses meet the requirement if the 3 rd dose was given on or after the 4 th birthday
Measles, Mumps, and Rubella (MMR)	Two doses of a measles-containing vaccine with the first dose on or after the first birthday; second dose required upon entry into kindergarten
Hepatitis B	Three doses
Varicella	One dose on or after 1 st birthday (Two doses if vaccine given at 13 years of age or older)
Hepatitis A	Two doses on or after 2 nd birthday for grades K-3 in selected counties

Requisitos estatales mínimos de vacunas para estudiantes de Texas de 2007 a 2008

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN

El estudiante mostrará pruebas aceptables de vacunación antes de ingresar, asistir o transferirse a una guardería o una escuela primaria o secundaria, pública o privada, de Texas.

VACUNA	Dosis necesarias
Difteria, tétano y tos ferina (DTap/DTP/DT/Tdap/Td)	Cinco dosis de vacuna que contiene difteria-tétano-tos ferina, una en de la cual debe haber sido recibida al cumplir cuatro años o después; sin embargo, 4 dosis cumplen con el requisito si la cuarta dosis se administró al cumplir cuatro años o después
Dosis de refuerzo Tdap/Td	Se necesita una dosis de la vacuna diez años después de la última dosis de la vacuna DTP/DTaP/DT
Polio	Cuatro dosis de vacuna de polio, una en de la cual debe haber sido recibida al cumplir cuatro años o después; sin embargo, 3 dosis cumplen con el requisito si la tercer dosis se administró al cumplir cuatro años o después
Sarampión, paperas y rubéola(MMR)	Dos dosis de vacuna que contiene sarampión con la primera dosis al cumplir un año o después; la segunda dosis se requiere a la entrada al jardín de la infancia (kindergarten)
Hepatitis B	Tres dosis
Varicela	Una dosis al cumplir un año o después(Se necesitan dos dosis si la vacuna se administra al cumplir los 13 años o después)
Hepatitis A	Dos dosis al cumplir dos años o después para los grados desde kinder hasta el 3 (K-3) en ciertos condados